



Patient Care Services
300 Pasteur Drive
Stanford, CA 94305

Tamoxifeno

Educación del paciente

Marca comercial en los EE.UU.: Nolvadex, Soltamox

Categoría terapéutica: Terapia hormonal

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar el cáncer de mama sensible a hormonas. El tamoxifeno también puede utilizarse para reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres que tengan un alto riesgo.

¿Cómo funciona?

- Este medicamento evita que el estrógeno se acople a su receptor dentro del cuerpo. El bloqueo de las hormonas que estimulan el crecimiento de células cancerosas de mama reduce el riesgo de estas crezcan.

¿Qué debe saber mi médico o enfermera antes de que yo tome este medicamento?

- Si usted es alérgico a alguna medicina.
- Si usted está tomando otros medicamentos recetados o sin receta, incluyendo vitaminas y hierbas medicinales.
- Si usted está tomando antidepresivos.
- Si está embarazada o si existe la posibilidad de que esté embarazada.
- Si usted está amamantando (dando el pecho).
- Si usted tiene problemas del hígado.
- Si usted está tomando el anticoagulante Warfarina.
- Si usted tiene antecedentes de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar.
- Si usted está usando un método anticonceptivo hormonal u hormonoterapia reconstitutiva, como las píldoras, los parches ó el anillo de estrógeno.

¿Cómo se administra este medicamento?

- Esta medicina se toma por vía oral una o dos veces por día.

¿Cuáles son las precauciones generales cuando se toma este medicamento?

- Hable con su médico o enfermera antes de tomar aspirina, productos que contengan aspirina, los medicamentos recetados o sin receta, incluyendo vitaminas y hierbas medicinales (Hierba de San Juan).
- Si usted o su pareja puede quedar embarazada, utilice una forma no hormonal para el control de la natalidad durante su tratamiento. Una vez completado el tratamiento, converse sobre el momento de interrumpir las medidas para el control de la natalidad con su profesional atención médica.
- Si usted tiene una cirugía electiva planeada, hable con su médico o enfermera si debe interrumpir temporalmente el tamoxifeno antes y después de la cirugía.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de este medicamento?

- Síntomas de la menopausia: bochornos, sofocos o rubor, sudoración nocturna, cambios de humor, sequedad vaginal o flujo vaginal, problemas con el sueño.
- Períodos menstruales irregulares o sin período (amenorrea). Esto no es una forma eficaz para el control de la natalidad.
- Leve aumento en el riesgo de coágulos sanguíneos.
- Leve incremento del riesgo cáncer de útero en las mujeres posmenopáusicas.
- Leve aumento en el riesgo de cataratas.
- Aumento de la resistencia del hueso.

Señales de peligro que debe reportar inmediatamente al doctor o a la enfermera:

- Se siente muy cansado, débil, mareado o con vahído.
- La aparición súbita de dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos con sangre.
- Dolor, enrojecimiento o inflamación en uno o ambos tobillos o pantorrillas.
- Sangrado vaginal o manchas de sangre después de la menopausia.

¿Cómo debo almacenar esta medicina?

- Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Consulte a su farmacéutico para obtener instrucciones sobre el almacenamiento y cómo deshacerse de este medicamento.

¿Qué tengo que hacer si se me olvida tomar una dosis?

- Si usted ha olvidado una o dos dosis, simplemente tome la siguiente dosis programada. Si usted ha fallado más de 2 dosis, comuníquese con su médico o enfermera.